

MACMILLAN CANCER SUPPORT

Nivolumab (Opdivo®) _ until Nov
2025_English: Chinese (Hong Kong)

納武利尤單抗（歐狄沃®）

納武利尤單抗（歐狄沃®）是一種免疫治療藥物。

什麼是納武利尤單抗（歐狄沃®）？

納武利尤單抗（歐狄沃®）是一種免疫治療藥物。它也可以被稱為檢查點抑製劑。納武利尤單抗可用於治療黑色素瘤、非小細胞肺癌、腎癌、何傑金氏淋巴瘤、間皮瘤、膀胱癌、食道癌或胃癌，以及部分 大腸癌或頭頸癌。

有時候也可用於治療其他癌症。最好將這些資訊與我們有關免疫治療藥物和您所患癌症類型的一般資訊一起閱讀。

在您同意（同意）接受治療前，您的癌症醫生會與您討論此治療及其可能的副作用。

有關此療法的更多資訊

此資訊在發佈時正確無誤。但有時，這種治療所用於的癌症類型或治療副作用可能會在修訂日期之間發生變化。

如果您想瞭解有關這種治療的更多詳細資訊，可以與您的癌症治療團隊聯絡。或者瀏覽電子藥品綱要 (eMC) 網站，該網站上有單個藥物的患者資料單張 (PIL)。

關於納武利尤單抗的使用

您將作為門診患者在門診部接受納武利尤單抗的治療。納武利尤單抗可以單獨給藥，也可以與其他抗癌藥物聯合使用。

在每次治療期間，您通常會見到：

- 癌症醫生
- 專科護士
- 專科藥劑師。

這些人就是我們在本資訊中所提到的醫生、護士和藥劑師。

在每次治療之前或治療當日，護士或經過抽血培訓的人員可能會抽取您的血液樣本。這用以檢查您是否可以安全接受治療。

在接受治療前，您將與醫生、護士或藥劑師交談。他們會告知您的驗血結果，詢問您最近的身體狀況。如果您的驗血結果沒有問題，藥劑師團隊就會為您的治療做準備。

納武利尤單抗透過靜脈滴注給藥（靜脈輸注）。根據劑量，給藥時間可以是 30 分鐘或 1 小時。

您的治療療程

您可能會每 2 週、每 3 週或每 4 週接受一次納武利尤單抗治療。您的醫生或藥劑師將與您討論您的治療計劃。

關於副作用

我們接下來會說明這種治療最常見的副作用。我們也將包括一些不太常見的副作用。這種治療可能會使免疫系統過於活躍。如果不及時治療，可能會導致嚴重副作用。

您可能會出現我們提及的某些副作用，但不太可能出現所有副作用。您可能會出現一些副作用，包括我們未在此列出的較罕見副作用。

其他癌症治療可能會引起不同的副作用。如果您也接受其他癌症治療，可能會出現其他副作用。

切勿嘗試自己治療副作用。如果您出現任何副作用，請務必告知您的醫生、護士或藥劑師。他們可以給您：

- 幫助控制一些副作用的藥物
- 有關控制副作用的建議。

嚴格按照指示服用任何藥物都很重要。這樣藥物可能會對您更有成效。

嚴重和危及性命的副作用

一些癌症治療可能會引起嚴重的副作用。有時，這些副作用可能會危及性命。您的醫生、護士或藥劑師可以向您解釋這些副作用的風險。

遲發性副作用

此治療也可能會引起遲發性副作用。可能在治療結束後的幾週、幾個月、甚至超過一年後才出現。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何症狀或副作用，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡您的醫院。如果不進行治療，副作用會變得很嚴重。

您的病人提醒卡

他們還會給您一張卡片，當中包含有關您的治療的資訊。在治療期間和治療結束後，請務必隨身攜帶卡片。您應該向任照顧您的專業醫護人員出示卡片。

聯絡醫院

您的醫生、護士或藥劑師將為您提供醫院的 24 小時聯絡電話。如果您感到不適或需要建議，不論是白天還是夜晚，您都可以隨時聯絡他們。請將這些電話號碼儲存在您的手機，或者保存在安全的地方。

治療期間的副作用

有些人在接受治療期間或治療不久後可能會出現副作用。

過敏反應

有些患者在接受治療時會產生過敏反應。過敏反應的徵狀包括：

- 感覺發熱或臉部泛紅
- 發抖
- 發癢
- 皮疹
- 感到頭暈或噁心
- 頭痛
- 呼吸困難或氣喘
- 臉部或嘴唇腫脹
- 背部、腹部或胸部疼痛

您的護士會在您接受治療期間檢查您是否出現過敏反應的徵狀。如果您感到不適或出現任何這些徵狀，請立即告訴他們。如果您確實有反應，他們可以快速治療。

有時候，過敏反應會在接受治療後的幾小時後發生。如果您出現任何這些症狀或回家後感到不適，請立即撥打 **24** 小時電話號碼聯絡醫院。

主要副作用

這種治療可能會使免疫系統過於活躍。這種治療可能會導致以下副作用。有些副作用十分罕見。但了解這些副作用同樣重要。

切勿嘗試自己治療這些副作用。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡您的醫院。

對肺部的影響

此治療可能會引起肺部發炎。這種情況稱為肺炎。如果您在治療期間或治療結束後察覺以下變化，請立即撥打 24 小時電話號碼與醫院聯絡：

- 呼吸困難
- 咳嗽不止
- 喘鳴
- 發燒，體溫超過 37.5°C。

如果之前的呼吸問題惡化，也應該告訴醫生。您可能需要接受測試，檢查您的肺部。您可能需要類固醇或其他治療。

腹瀉或肚痛

您可能會有腹瀉或肚（腹）痛。這種治療也可能會導致非常嚴重的腸道發炎（結腸炎）。

腹瀉是指排便次數比正常情況多，或是水樣便或稀便。如果您有造口，腹瀉可能會比平常更頻繁。

如果您在治療期間或治療結束後出現以下症狀，請立即撥打 24 小時電話與醫院聯絡：

- 您一天腹瀉 4 次或以上。
- 您的造口活動中度增加。
- 您有不舒服的胃痙攣。
- 您在晚間有腹瀉。
- 您的體溫超過 37.5°C。
- 便血或大便含有黏液。

您可能需要去醫院接受滴注或其他治療，如類固醇。

對肝臟的影響

這種治療可能會導致肝臟炎症，並可能影響肝臟的功能。這種情況稱為肝炎。您將定期接受血液測試，檢查相關情況。如果血液檢查顯示肝臟有變化，您可能需要使用類固醇。

有時肝臟的變化會很嚴重。如果您在治療期間或治療結束後出現以下症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼與醫院聯絡：

- 皮膚或眼睛發黃
- 感到非常睏倦
- 黑尿
- 不明原因的出血或瘀傷
- 肚（腹部）的右側疼痛
- 食慾不振。

對腎臟的影響

這種治療可能會導致腎臟炎症，並可能影響腎臟的功能。這種情況稱為腎炎。這種情況並不常見，但如果不治療，可能會變得嚴重。您需要接受定期驗血以便確認您的腎臟功能。如果檢查顯示腎臟有變化，您可能需要使用類固醇或其他治療方法。

如果您在治療期間或治療結束後察覺以下症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼與醫院聯絡：

- 尿液（小便）中帶血
- 排尿量減少或小便次數比平時少。

荷爾蒙的變化

這種治療可能會影響您的荷爾蒙。荷爾蒙控制着體內許多不同的運作過程。您將定期進行血液測試，檢查您的荷爾蒙水平。如果您在治療期間或治療結束後出現以下副作用，請撥打 24 小時電話與醫院聯絡：

- 出汗增多
- 體重增加或減輕
- 頭暈或昏厥
- 感到比平時更餓或更渴
- 喪失性慾
- 尿頻
- 持續性頭痛
- 感覺比平常更疲倦（疲勞）
- 情緒變化。

您可能需要接受藥物來控制荷爾蒙水平。

血糖水平的變化

這種治療可能會影響血糖水平。您將定期接受血液測試，檢查相關情況。

您的血糖水平可能會升高。血糖水平升高的症狀包括：

- 感到口渴
- 尿頻
- 感覺疲憊。

如果您患有糖尿病，您的血糖可能高於一般水平。您的醫生會告訴您如何應對這種情況。

這種治療還可以降低血糖水平。血糖水平下降的症狀包括：

- 感到飢餓
- 感到頭暈、焦慮或煩躁
- 出汗。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些症狀，請務必告訴您的醫生或護士。

胰臟腫脹（胰臟炎）

這種治療可能會導致您的胰臟腫脹（胰臟炎）。如果您的上腹部劇烈疼痛並伴有噁心和嘔吐，請立即告訴您的醫生。

皮膚變化

這種治療可能會導致皮膚發炎。通常是輕微發炎，但如果不治療，可能會變得嚴重。您可能需要使用乳霜、類固醇或其他藥物來治療問題。如果您在治療期間或治療結束後發現皮膚發生變化，請盡快撥打 **24 小時電話號碼**聯絡醫院。皮膚變化可能包括：

- 皮膚出現皮疹或腫塊
- 皮膚乾燥或痕癢
- 皮膚發白或出現白塊。

為了保護皮膚免受陽光照射，請使用 **SPF 系數至少為 30** 的防曬霜。**SPF** 代表防曬系數。用衣服和帽子遮蓋起來。

如果您有以下任何症狀，請立即撥打 **24 小時電話號碼**聯絡醫院：

- 皮疹蔓延
- 皮膚出現水泡或脫皮
- 出現類似流感的症狀，如高燒和關節疼痛。

這些症狀可能是嚴重皮膚反應的徵兆，需要立即去醫院接受治療。

無力、麻木、刺痛

此治療可能會影響神經。這種情況並不常見，但如果不治療，可能會變得嚴重。這些副作用開始出現時可能很輕微。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 扣鈕扣或做其他細微的工作時遇到困難
- 手臂、腿部或面部出現無力、麻木或刺痛
- 頭痛
- 眩暈
- 身體其他部位出現無法解釋的疼痛。

您可能需要類固醇和其他治療。

對心臟的影響

這種治療會影響心臟的功能。這種情況並不常見，但可能會很嚴重。您可能需要接受檢測，以了解心臟的運作狀況。這些檢測可能會在治療之前、期間或之後進行。

如果您在治療期間或治療後出現任何以下症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 呼吸困難
- 眩暈
- 心率改變
- 腳和腳趾腫脹。

這些症狀可能是由其他疾病所致，但請務必讓醫生進行檢查，這點非常重要。如果您有以下情況，

請務必撥打 999：

- 胸痛、壓迫感、沉重感、胸悶或胸部擠壓感
- 呼吸困難。

如果您的症狀是由此治療引起的，您可能需要類固醇。您可能會在醫院接受監察一段時間。

肌肉和關節疼痛

此治療可能導致肌肉酸痛或無力。您的關節也可能會僵硬、疼痛或腫脹（關節炎）。如果您已經有關節疼痛的問題，可能會變得更嚴重。如果您在治療期間或治療結束後出現以下症狀，請撥打 24 小時電話與醫院聯絡：

- 新的疼痛或疼痛加劇
- 新的關節僵硬或情況惡化
- 關節腫脹。

您可能需要接受類固醇或其他治療，例如使用止痛藥。

對大腦和脊髓的影響

此治療可能會導致神經發炎。這種情況並不常見，但可能會很嚴重。如果您在治療期間或治療結束後出現任何以下副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 頸部僵硬
- 頭痛
- 發燒或發冷
- 感覺噁心（反胃）或出現嘔吐。
- 眼睛畏光
- 感到迷惑或睏倦。

這些症狀可能是由其他疾病所致，但請務必讓醫生進行檢查，這點非常重要。如果您的症狀是由此治療引起的，您可能需要使用類固醇，並可能在醫院接受監察一段時間。

視力變化

此治療可能會影響您的眼睛和視力。您可能會出現眼睛乾澀或視力模糊。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 眼睛痠痛、疼痛或腫脹
- 眼睛畏光
- 視力改變。

您可能需要類固醇或其他治療。專業眼科醫生（眼科醫生）可能也需要檢查您的眼睛。

感到疲倦（疲勞）

感到疲倦是這種治療的常見副作用。盡量根據自己的節奏計劃好每一天，以便您有足夠的時間休息。溫和的運動（例如短距離散步）可以幫助您減輕疲勞。

有時，疲勞是由於這種治療對產生荷爾蒙的腺體造成影響而引起的。如果您的荷爾蒙水平較低，您可能需要接受荷爾蒙替代藥物。

如果治療期間或結束後發生以下任何情況，請聯絡您的癌症團隊或醫院：

- 疲倦惡化
- 您感到虛弱或顫抖。

若您感覺睏倦，切勿駕車或使用機械設備。

感覺噁心

您的醫生、護士或藥劑師可以處方一些抗噁心藥物來幫助您預防或控制噁心。即使您沒有噁心，也請嚴格遵守指示服藥。預防噁心比在出現噁心後再治療要更容易。

如果您感到噁心，可以經常以小口方式飲用飲料並少食多餐。喝足夠的液體十分重要。如果您持續感到噁心，或 24 小時內噁心（嘔吐）1 至 2 次，請盡快撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院。他們會為您提供建議。他們可能會改變您的抗噁心治療藥物。如果您仍然感到噁心，請告知他們。

食慾不振

此治療可能會影響您的食慾。如果您一兩天沒有胃口，不用太擔心。但如果幾天後您的食慾沒有恢復，或者您的體重正在減輕，請告訴您的醫生、護士或藥劑師。他們可以為您提供建議。他們可能會為您提供食品或飲品補充劑。或者可能會建議您改變飲食習慣來幫助您。

頭痛

此治療可能會引起頭痛。如果您有頭痛，請告訴您的醫生、護士或藥劑師。他們可以為您提供可能有幫助的止痛藥建議。如果頭痛沒有好轉或加劇，請告訴他們。

其他可能的副作用

白血球數量低

此治療可能會導致您血液中的白血球數量減少。白血球負責抵抗感染。如果有感染的跡象，請告訴您的醫生、護士或藥劑師。這些跡象包括：

- 咳嗽
- 喉嚨痛
- 腹瀉
- 需要經常排尿（小便），或排尿時感到不適。

如果您有以下任何症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 體溫高於 37.5°C
- 體溫低於 36°C
- 即使體溫正常，您仍感到不適。

瘀傷和出血

此治療可能會減少您血液中的血小板數量。血小板是幫助血液凝結的細胞。

如果血小板數量偏低，您可能很容易瘀傷或出血。您可能有以下徵狀：

- 流鼻血
- 牙齦出血
- 月經量過多
- 尿血或便血
- 微小的紅色、啡色或紫色斑點，可能看起來像皮疹——如果您的皮膚是黑色或啡色，這些斑點可能很難看到。

如果您有任何不明原因的瘀傷或出血，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院。您可能需要接受滴注，輸入額外的血小板。這稱之為血小板輸注。

貧血（紅血球數量減少）

此治療可能會導致您血液中的紅血球數量減少。紅血球為全身輸送氧氣。如果紅血球數量很少，這被稱為貧血。您可能會覺得：

- 沒有精力
- 呼吸困難
- 頭暈目眩。

如果您出現這些症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院。您可能需要接受貧血治療。如果您是嚴重貧血，可能需要透過靜脈注射來輸注額外的紅血球。我們稱之為輸血。

脫髮

您可能會發現您的頭髮慢慢變薄。但不太可能會所有頭髮都掉光。您的頭髮也可能會變得更脆弱。您的護士可以為您提供有關應對脫髮的資訊。治療結束後，您的頭髮通常會重新長出來。

水腫

這種治療可能會導致體內累積液體。治療結束後，情況將會好轉。如果出現以下情況，請撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 體重增加
- 面部、腿部或腳趾腫脹。

他們可以為您提供有用的建議和治療。

便秘

這種治療可能會導致便秘。便秘是指您不能像平時那樣通暢地排便。而是會變得困難或痛苦。以下是一些建議，可能對您有所幫助：

- 每天喝最少 2 公升（3.5 品脫）的水。
- 吃高纖維食物，例如水果、蔬菜和全麥麵包。
- 定期進行輕度運動，例如散步。

如果您有便秘，請撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院尋求建議。他們可以為您提供稱為瀉藥的藥物來幫助您。

如果您超過兩天無法排便並且出現噁心，請立即聯絡 24 小時電話號碼號碼。

口腔和喉嚨痛

此治療可能會導致口腔和喉嚨痛。還可能會導致口腔潰瘍。這將使您的口腔更有可能受到感染。在早上、晚上和吃飯之後使用軟毛牙刷清潔牙齒或假牙。

如果出現以下情況，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 口腔或喉嚨疼痛影響了您的食量或飲水量
- 您的口腔、舌頭、喉嚨或嘴唇出現水泡、潰瘍或白斑。

他們會給您建議、漱口水或藥物來幫助緩解疼痛或治療感染。請聽從他們的建議，並確保您：

- 飲用大量的水
- 避免煙酒
- 避免刺激口腔和喉嚨的食物或飲料。

口乾

您可能會感到口乾。飲用大量液體，以及在食物中加入醬汁和調味劑，保持食物的濕潤。如果您的嘴唇乾涸，使用潤唇膏或凡士林可能有幫助。

淋巴結腫大

納武利尤單抗可能會導致淋巴結（腺體）腫大。如果您發現您的頸部、腋窩或腹股溝處有新的腫塊，請告知您的醫生。。

高血壓

如果您的血壓出現任何問題，請告訴您的醫生或護士。您的護士會在治療期間定期檢查您的血壓。如果出現頭痛，請告知護士。

發燒

服用納武利尤單抗時，您可能會發燒或發冷。如果發生這種情況，請告訴您的專科醫生或護士。

其他重要資訊

血栓風險

癌症和一些癌症治療可能會增加罹患血栓的風險。如果您在治療期間或治療後出現任何以下症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 腿部或手臂出現抽痛或腫脹
- 該區域的皮膚變紅：如果您的皮膚是黑色或啡色，這可能更難注意到，但皮膚可能會變黑
- 突然感覺呼吸困難或咳嗽。

如果您有以下情況，請務必撥打 999：

- 胸痛
- 呼吸困難。

血栓很嚴重，但可以用抗凝血劑藥物治療。這樣可以稀釋血液。您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供有關預防和治療血栓的更多資訊。

其他藥物

有些藥物可能會影響這種治療的效果，或在您接受治療時有害。請務必告知您的癌症醫師、護士或藥劑師您正在服用或計劃服用的任何藥物，例如：

- 您的處方藥物
- 您在商店、藥房或網上購買的藥物
- 維他命或保健品
- 草藥和輔助療法或順勢療法
- 娛樂性藥物，例如大麻。

接種疫苗

醫生通常會建議癌症患者接種流感疫苗和新冠病毒疫苗 (covid)。這些有助於降低因這些感染而患嚴重疾病的風險。大多數人都可以接種這些疫苗，包括免疫系統較弱的人。

如果您的免疫系統較弱，則不應接種減活疫苗。減活疫苗可能會讓您感到不適，因為它們含有可以保護您免受感染某種疾病的非常弱的病毒。減活疫苗包括 **Zostavax**（一種帶狀皰疹疫苗）和黃熱病疫苗。

向您的醫生、護士或藥劑師詢問有關接種疫苗的建議非常重要。他們可以解釋哪些疫苗適合您以及何時最好接種疫苗。

避孕

您的醫生、護士或藥劑師會建議您在接受治療期間及治療後一段時間內不要懷孕或使他人懷孕。藥物可能會損害胎兒的發育。採取避孕措施預防懷孕非常重要。遵循他們關於以下各項的建議：

- 使用甚麼類型的避孕方法
- 治療後多久您應該繼續採取避孕措施。

哺乳

建議您在接受治療期間或治療結束後的一段時間內不要哺乳。這是因為嬰兒會藉由母乳攝取藥物。

您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供更多資訊。

生育能力

一些抗癌藥物可能會影響您是否可以懷孕或使他人懷孕。如果您擔心自己的生育能力受到影響，請務必在治療開始之前向您的醫生查詢。

醫療和牙科治療

如果您因癌症以外的任何原因需要接受治療，請務必告訴專業醫護人員您正在接受癌症治療。向他們出示您的病人提醒卡。向他們提供您的癌症醫生或癌症治療團隊的聯絡方式，以便他們尋求建議。

如果您預約牙醫或視光師，請務必告訴他們您正在接受癌症治療。在進行任何牙科治療之前，請先諮詢您的癌症治療團隊。

關於我們的資訊

參考資料

瀏覽電子藥品綱要 (eMC)，下載患者資料單張 (PIL)，瞭解更多詳細資訊。該單張列出了所有已知的副作用。

審閱員

本資訊由麥克米倫癌症援助機構 (Macmillan Cancer Support) 癌症資訊開發團隊編寫、修訂和編輯。本資訊已經過專業醫療人員和癌症患者的審閱。

我們的癌症資訊已獲 **PIF TICK** 認可。該品質標誌由患者資訊論壇所創，表明我們符合 PIF 的 10 項可信賴健康資訊標準。

我們使用的語言

我們希望每個受癌症影響的人都能感受到我們的資訊是為他們而寫的。我們希望能

確保我們的資訊盡可能的清晰易明。為此，我們嘗試：

- 使用簡單的英語
- 對醫學詞彙加以解釋
- 使用簡短的句子
- 使用插圖解釋文字
- 清晰地編排資訊
- 確保清楚說明重點。

我們使用性別包容的語言，用「您」來稱呼我們的讀者，以便讓每個人都感到被包容。在臨床上有需要時，我們會使用「男士」和「女士」或「男性」和「女性」這些詞匯。例如，我們在談論身體部位或提及有關哪些人受影響的統計資料或研究時會這樣做。

您可以在[這裏](#)進一步瞭解我們如何編製我們的資訊。

審閱日期

審閱日期：2023 年 11 月 1 日 | 下次審閱日期：2025 年 11 月 1 日



我們的癌症資訊符合 **PIF TICK** 質素標準。

即是，這些資訊易於使用、及時更新並且基於最新證據。進一步瞭解我們如何製作我們的資訊。

我們可以怎樣幫助您

麥克米倫癌症援助機構 (Macmillan Cancer Support) 已付費請翻譯公司將上述資訊翻譯成您的語言。

獲得合適的護理和援助

如果您患有癌症並且不會說英語，您可能會擔心會影響您的癌症治療和護理。但是您的醫療團隊應該可以為您提供能滿足您需要的護理、援助和資訊。

我們知道，有時尋找合適的援助可能會面對額外的困難。例如，如果您有工作或家庭，可能很難抽出時間到醫院出席預約覆診。您可能還會擔心金錢和交通費。所有這些事情都會讓人感到壓力和難以應對。

但我們可以提供幫助。我們的支援熱線可以用您的語言就您的情況提供建議。您可以與護士、經濟援助顧問、福利權益顧問和工作援助顧問交談。我們還向癌症患者提供麥克米倫 (Macmillan) 資助金。這是一次性的款項，可用於支付醫院停車費、交通費、托兒或暖氣費等費用。

用您的語言詢問麥克米倫 (Macmillan)

您可致電麥克米倫 (Macmillan) 免費電話 0808 808 00 00 透過傳譯員用您的母語與我們交談。您可以同我們討論您的憂慮和醫療問題。致電時，只需用英語告訴我們您想使用的語言。熱線服務時間為每週一到週日上午 8 時至晚上 8 時。

© 麥克米倫癌症援助機構 (Macmillan Cancer Support) 2024 是於英格蘭和威爾斯 (261017)、蘇格蘭 (SC039907) 和馬恩島 (604) 註冊的慈善機構，同時也在北愛爾蘭經營。本機構是一間有限責任公司，於英格蘭和威爾斯註冊，公司編號 2400969。馬恩島公司編號 4694F。註冊辦事處：3rd Floor, Bronze Building, The Forge, 105 Sumner Street, London, SE1 9HZ。增值稅號：668265007

我們盡一切努力確保我們提供的資訊是準確和最新的，但請不要依賴這些資訊來替代針對您的情況的專業建議。在法律允許的範圍內，麥克米倫 (Macmillan) 不承擔與使用本出版物中的任何資訊或其中包含或提及的第三方資訊或網站相關的責任。