

Asciminib (Scemblix®)

Asciminib (Scemblix®) 是一種標靶治療藥物。

Asciminib (Scemblix®)

Asciminib (Scemblix®) 屬於一組稱為酪胺酸激酶抑制劑 (TKI) 的標靶治療藥物。其用於治療慢性骨髓性白血病 (CML)。

其用於白血病細胞發生稱為費城染色體的基因改變時（費城染色體陽性）。您的醫師可以檢測您的血液或骨髓以尋找費城染色體。

有時可以用於治療其他癌症。建議您將本藥物資訊與我們提供的有關標靶治療藥物以及您所患癌症類型的一般資訊一同閱讀。

在您同意接受治療之前，您的癌症治療醫師、護理師或藥劑師將與您討論此治療及其可能出現的副作用。

關於此治療的更多資訊

此資訊在發佈時正確無誤。但有時，使用此治療的癌症類型或治療副作用，可能會在修訂日期之間發生變化。

如果您想了解更多有關此治療的更多詳細資訊，您可以聯絡您的癌症團隊。或造訪英國藥品彙整電子資料庫 (eMC) 網站，其中包含個別藥物的藥品說明書 (PIL)。

如何施用 asciminib

Asciminib 為適合居家服用的藥片形式。在治療期間，您通常會接觸到：

- 血癌醫師（血液科醫師）
- 癌症護理師或專科護理師
- 專科藥劑師。

這些人是我們在本資訊中所提到的醫師、護理師或藥劑師。

在治療期間，護理師或受過抽血訓練的人員（抽血師）會定期抽取您的血液樣本。這是為了檢查您繼續接受治療是否安全。

在治療期間，您將定期與醫師、護理師或藥劑師會談。他們會詢問您近期的感覺如何，並檢查您的血液結果是否正常。

您的治療過程

您通常會服用 asciminib，只要其對您有效並且可以控制任何副作用。在未諮詢醫師的情況下，請勿停止服用。

正在服用 asciminib 藥片

護理師或藥劑師會給您一些藥片帶回家服用。務必按照指示服用。這對於確保藥片會盡可能為您發揮其功效非常重要。您可能會獲得不同強度的藥片。

您每天服用 asciminib 一次或兩次。您的醫師、護理師或藥劑師將解釋如何以及何時服用藥片。應盡量於每天相同時間服用。

Asciminib 不應與食物一起服用。應於飯後至少 2 小時服用藥片，然後至少等待 1 小時後再進食。以白開水吞服整個藥片。請勿將其掰開、咀嚼或壓碎。於每天相同時間服用。

如果您忘記服用藥片，請勿服用雙份劑量來補充錯過的劑量。

- 如果您的服藥頻率為每天服用**一次**，但您忘記服藥，請在想起時立即服用。但如果您延遲服藥超過 12 小時，請跳過該劑量並安排定時間服用下一劑。
- 如果您的服藥頻率為每天服用**兩次**，但您忘記服藥，請在想起時立即服用。但如果您延遲服藥超過 6 小時，請跳過該劑量並安排定時間服用下一劑。
- 如果您在服用藥片後立即感到不適，請勿再服用另一劑。安排定時間服用下一劑。

以下是需要記住有關於該藥片的其他事項：

- 服用藥片後請洗手。
- 應避免其他人直接接觸藥片。

將藥片存放在原包裝中並保存於室溫下，避免潮濕、熱源和陽光直射。

- 將藥片放在兒童看不到或接觸不到的地方。
- 停止治療時，請將剩餘藥片退還給藥劑師。

乳糖

此治療可能含有乳糖。如果您對乳糖過敏或不耐受，請諮詢您的醫師、護理師或藥劑師以了解更多資訊。

關於副作用

我們在此說明此治療最常見的副作用，我們也包含一些較不常見的副作用。

您可能會出現我們提及的某些副作用，但不太可能出現所有的副作用。您可能還會出現一些未在此處列出的罕見副作用。

其他癌症治療可能會引起不同的副作用。如果您也接受其他癌症治療，可能會出現其他副作用。

請務必將您的任何副作用告知您的醫師、護理師或藥劑師。他們可以為您提供：

- 幫助控制某些副作用的藥物
- 有關管理副作用的建議。

嚴格按照指示服用任何藥物非常重要。這表示藥物可能會對您更有成效。

嚴重和危及生命的副作用

某些癌症治療可能會導致嚴重的副作用。有時，這些可能會危及生命。您的醫師、護理師或藥劑師可以向您解釋這些副作用的風險。

聯絡醫院

您的醫師、護理師或藥劑師將為您提供醫院的 24 小時聯絡電話。若您感到不適或需要建議，不論是白天還是夜晚，您隨時都可以聯絡醫院。將這些號碼儲存在您的手機上或者記在安全的地方。

常見的副作用

感染風險

此治療可以減少您血液中的白血球數量。白血球對抗感染。如果您的白血球數量較少，您可能更容易受到感染。白血球數量低叫做嗜中性球減少症。

當白血球數量低時，感染可能非常嚴重。必須盡快治療任何感染。遇到下列症狀時，請立即使用 24 小時電話聯絡醫院。

- 體溫高於 37.5°C
- 體溫低於 36°C
- 您感到不適，即使體溫正常
- 您有感染的症狀。

感染的症狀包括：

- 感覺發冷和顫抖
- 喉嚨痛
- 咳嗽
- 呼吸困難
- 腹瀉
- 需要經常排尿（小便），或者排尿時感到不適。

遵循癌症治療團隊為您提供的任何具體建議非常重要。

在治療期間您將定期進行驗血。如果您的白血球數量很低，您的醫師可能會將您的治療暫停一小段時間，直至白血球數量增加。有時醫師會減少您的治療劑量。

瘀傷和出血

此治療會減少您血液中的血小板數量。血小板是幫助血液凝結的細胞。

如果血小板數量很少，您可能會容易瘀傷或出血。您可能會有下列情況：

- 流鼻血
- 牙齦出血
- 月經量大
- 尿液（小便）或糞便（大便）中有血
- 微小的紅色、棕色或紫色斑點，可能看起來像皮疹；如果您的皮膚為黑色或棕色，可能很難注意到這些斑點。

如果您有任何不明原因的瘀傷或出血，請立即撥打 24 小時電話聯絡醫院。您可能需要接受輸注，輸入額外的血小板。這稱之為血小板輸注。

貧血（紅血球數量少）

此治療可能會減少您血液中的紅血球數量。紅細胞負責為全身輸送氧氣。如果紅血球數量低，則此情況稱為貧血。您可能會感覺到：

- 活力嚴重不足
- 呼吸困難
- 暈眩及頭暈。

如果您出現這些情況，請立即使用 24 小時電話聯絡醫院。您可能需要對貧血進行治療。若您嚴重貧血，您可能需要透過輸注輸入額外的紅血球。這稱之為輸血。

腹部疼痛

您可能會感到肚子（腹部）輕微疼痛或消化不良。醫師、護理師或藥劑師會給您開藥來幫助改善這些症狀。

有時，腹部疼痛可能是一種更嚴重問題（稱為胰臟炎）的徵兆。如果疼痛更加嚴重或沒有改善，請告知您的醫師、護理師或藥劑師。

對胰臟的影響

此治療可能會導致胰臟發炎（胰臟炎）。您將定期進行驗血以檢查您的胰臟。

如果您出現下列症狀，請立即使用您留存的 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 肚子中心（上腹部）劇烈疼痛
- 肚子壓痛或腫脹
- 心跳加快（心跳過速）
- 呼吸急促
- 體溫達 37.5°C 或更高（發燒）
- 皮膚或眼睛發黃
- 噁心或想吐
- 消化不良。

對肝臟的影響

此治療可能會影響您肝臟的運作方式。您需要定期接受驗血以便確認您的肝臟功能。

腹瀉

此治療可能會引起腹瀉。腹瀉的意思是，上廁所（排便）比您正常的情况還多，或者水樣便或稀便。您也可能會出現胃痙攣。如果您有造口，其可能會比平時更加活躍。

如果您每天拉稀便 3 次或以上，這對您來說不正常，請盡快撥打 24 小時電話聯絡醫院。遵循他們給您的建議：

- 服用止瀉藥
- 喝足夠的液體以保持水分，並補充流失的鹽分和礦物質
- 任何可能有幫助的飲食改變。

他們也可能要求您提供糞便樣本，以檢查是否有感染。

感到不適

您可能會因此治療而感到不適。您的醫師、護理師或藥劑師可能會為您開立緩解-不適的藥物，以幫助預防或控制不適。完全按照他們的指示服用藥物。若您感到不適，可以小口飲用飲料並少量多餐。喝足夠的水很重要。

如果您持續感到不適，或者在 24 小時內感到不適（嘔吐）1 至 2 次，請盡快撥打 24 小時電話聯絡醫院。他們可以為您提供建議。

頭痛和頭暈

此治療可能會引發頭痛和頭暈。如果您出現這些症狀，請告訴您的醫師、護理師或藥劑師。他們可以開藥給您以提供協助。

肌肉或關節疼痛（一般）

在治療期間，您可能會出現肌肉或關節疼痛等症狀。如果您出現此症狀，請告訴您的醫師、護理師或藥劑師。他們可以為您開立一些止痛藥和提供建議。他們也可以告訴您平常服用的止痛藥是否合適。

如果疼痛情況並未好轉，請告知您的醫師、護理師或藥劑師。泡溫水澡和定期休息可能有幫助。

感覺疲勞（疲倦）

感覺疲勞是此治療的常見副作用。請盡量根據自己的節奏計劃好每一天的安排，這樣您就有足夠的時間休息。溫和的運動（例如短距離散步）可以幫助您減輕疲勞。若您感覺困倦，切勿駕車或操作機械設備。

食慾不振

此治療可能會影響您的食慾。如果您一天或兩天沒有胃口，不要擔心。但是，如果您在幾天後仍沒有恢復食慾，或者您體重減輕，請告訴您的醫師、護理師或藥劑師。他們可以為您提供建議。他們可能會給您食物或飲料補充劑。或者他們可能會建議改變您的飲食或飲食習慣來幫助您。

皮膚變化

此治療可能會影響您的皮膚。您可能會感覺皮膚乾燥。您可能會出現皮疹，並可能會發癢。請務必告知醫師、護理師或藥劑師您所出現的任何皮膚變化情況。他們可以為您提供建議、開立保濕霜或藥物來幫助緩解。

若您感到皮膚乾燥，可每天嘗試使用無皂清潔劑和不含香料的保濕霜。

對肺部的影響

此治療可能會導致肺部出現變化。有時會導致肺內壁積液。這稱為肋膜積水。如果出現以下情況，請告知您的醫師：

- 持續咳嗽
- 喘鳴
- 呼吸困難。

如果現有的呼吸問題惡化，您也應該告訴醫師。您可能需要進行肺部檢查。

積液

此治療可能會導致體內積液。此情況在治療結束後會逐漸好轉。如果您有以下情況，請撥打 24 小時電話聯絡醫院：

- 體重持續增加
- 臉部、腿部或腳踝腫脹。

醫師可以為您提供建議和治療來幫助您。

膽固醇含量升高

此治療可能會提高膽固醇含量。膽固醇是血液中的一種脂肪物質。您可能會需要驗血以檢查膽固醇含量。您的醫師可能會將您轉介給營養師以獲得飲食建議，或開立藥物來控制您的膽固醇含量。

不太常見的副作用

對心臟的影響

此治療會影響心臟的運作。您可能需要進行一些檢測，檢查心臟的運作情況。這些檢測可以在治療前、治療中和治療後進行。

如果治療引起心臟問題，醫師可能會變更您正在接受的治療類型。

如果您在治療期間或治療後出現以下任何症狀，請立即撥打 24 小時電話聯絡醫院：

- 呼吸困難
- 頭暈
- 心跳變化
- 足部和腳踝腫脹。

這些症狀可能是由其他狀況引發的，但您務必要讓醫師進行檢查，這點非常重要。如果您有以下情況，請務必撥打 999：

- 胸痛、壓力、沉悶、緊張或感到胸悶
- 呼吸困難。

高血壓

此治療可能會導致高血壓。您的護理師將在治療期間定期為您檢查血壓。假如您出現任何頭痛，應告訴他們。

眼睛問題

此治療可能會讓您的眼睛感到乾澀。如果您有這種情況，請告訴您的醫師、護理師或藥劑師，以便他們提供幫助建議。

此治療也會導致視力模糊。如果您發現視力發生變化，請務必告訴您的醫師、護理師或藥劑師。如果您注意到這一點，請勿開車。

過敏反應

有些人在接受此治療時會產生過敏反應。有時候，過敏反應會在您服用藥片後的幾個小時內發生。過敏反應的症狀包括：

- 發熱或潮紅
- 發抖
- 發癢
- 皮疹

- 感到頭暈或噁心
- 頭痛
- 感到呼吸困難或氣喘
- 臉部或嘴唇腫脹
- 背部、腹部或胸部疼痛。

如果您感到不適或出現任何這些情況，請立即撥打 24 小時電話聯絡醫院。如果您出現過敏反應，可以盡早進行治療。

其他重要資訊

血栓風險

癌症和某些癌症治療可能會增加血栓的發生風險。如果您在治療期間或治療後出現以下任何症狀，請立即撥打 24 小時電話聯絡醫院：

- 手腳疼痛或腫脹
- 該區域的皮膚變紅 - 如果您的皮膚為黑色或棕色，這可能更難注意到，但皮膚可能會變更黑
- 突然喘不過氣或咳嗽。

如果您有以下情況，請務必撥打 999：

- 胸痛
- 呼吸困難。

血栓雖然嚴重，但您的醫師可以使用稱為抗凝血劑的藥物來治療。這些藥物可以稀釋血液。您的醫師、護理師或藥劑師可以為您提供有關預防和治療血栓的更多資訊。

其他藥物

接受治療時服用某些藥物可能會影響治療或有害健康。如果您正在服用或打算服用任何藥物，請謹記要告知您的癌症醫師、護理師或藥劑師，這些藥物包括：

- 為您開立的處方藥物
- 您在商店、藥局或網路上購買的藥物
- 維生素或補充劑
- 草藥和補充或順勢療法
- 娛樂性藥物，例如大麻。

接種疫苗

醫師通常會建議癌症患者接種流感疫苗和冠狀病毒 (covid) 疫苗。這些有助於降低因這些感染而罹

患嚴重疾病的風險。大多數的人都可以接種這些疫苗，包括免疫系統較弱的人。

如果您的免疫系統較弱，您應該避免接種活性疫苗。活性疫苗可能會讓您感到不適，因為其含有非常弱的疾病版本，進而保護您避免受到感染。活性疫苗包括 **Zostavax**（一種帶狀皰疹疫苗）和黃熱病疫苗。

務必向您的醫師、護理師或藥劑師詢問有關接種疫苗的建議。他們可以解釋哪些疫苗適合您，以及接種疫苗的最佳時機。

B 型肝炎再活化

如果您過去患有稱為 **B 型肝炎** 的肝臟感染，此治療可能使其再次活化。您的醫師或護理師會就這方面與您討論。他們將對您進行 **B 型肝炎** 檢測。

避孕

您的醫師、護理師或藥劑師會建議您在接受此治療期間以及治療後的一段時間內不要懷孕或令女方懷孕。這些藥物可能會損害胎兒的發育。務必使用避孕措施來預防懷孕。遵循他們對下列事項的建議：

- 使用何種類型的避孕方法
- 治療後應持續使用避孕措施的時間。

母乳哺育

建議您在此治療期間或治療結束後的一段時間內不要哺乳。這是因為嬰兒會藉由母乳攝入藥物。

您的醫師、護理師或藥劑師可以為您提供更多資訊。

生育能力

某些抗癌藥物會影響您是否能夠懷孕或令女方懷孕。若您擔心這個問題，請在治療開始之前諮詢您的醫師。

醫療和牙科治療

若您因為癌症以外的原因需要接受藥物治療，請務必要告知醫療保健專業人員您正在接受癌症治療。向其提供您的癌症醫師或癌症團隊的聯絡資料，以便其尋求建議。

如果您預約牙醫，請務必告訴他們您正在接受癌症治療。在進行任何牙科治療之前，請先諮詢您的癌症團隊。

修訂日期

修訂日期：2024

年 6 月 1 日 | 下次修訂日期：2026 年 6 月 1 日



我們的癌症資訊符合 **PIF TICK** 品質標誌。

這代表其易於使用、最新且以最新證據為基礎。詳細了解 [我們如何獲得資訊](#)。

麥克米倫癌症援助機構 (Macmillan Cancer Support) 已付費請翻譯公司將此資訊翻譯成您的語言。

獲得正確的護理和支援

如果您患有癌症且不會說英語，您可能會擔心這會影響您的癌症治療和護理。但是您的醫療團隊應該為您提供符合您需求的護理、支援和資訊。我們知道，有時人們在獲得適當的支援上可能會面對額外的挑戰。例如，如果您有工作或家庭，可能很難抽出時間去醫院複診。您可能還會擔心金錢和交通費用。所有問題都會給您帶來壓力，讓您難以承受。但我們可以提供幫助。我們的支援熱線可以用您的語言就您的情況提供建議。您可以與護理師、財務指導、福利權利顧問和工作支援顧問交談。我們也為癌症患者提供麥克米倫補助金 (Macmillan Grants)。這些一次性付款可用於支付醫院停車費、交通費、托兒費或暖氣費用等。

用您的語言聯絡麥克米倫 (Macmillan)

您可撥打麥克米倫 (Macmillan) 免費熱線 0808 808 00 00 透過口譯員用您的母語與我們交談。您可以同我們討論您的憂慮和醫療問題。僅需在致電時用英語告訴我們您的語言即可。我們的營業時間為每日上午 8 時至晚上 8 時。

麥克米倫 (Macmillan) 癌症援助機構 2022 為於英格蘭和威爾斯 (261017)、蘇格蘭 (SC039907) 及曼島 (604) 合法登記註冊的慈善機構。同時也在北愛爾蘭經營。於英格蘭與威爾斯登記註冊的擔保有限公司，公司號碼：2400969。曼島公司號碼：4694F。註冊辦事處：3rd Floor, Bronze Building, The Forge, 105 Sumner Street, London, SE1 9HZ。增值稅編號：668265007

我們盡最大努力確保我們提供的資訊準確無誤且是最新版本，但不應依靠這些資訊來替代專家根據您的情況而給予的專業意見。在法律允許的範圍內，麥克米倫 (Macmillan) 不對此資訊、第三方資訊或網站上所提供或有所關聯的資訊承擔任何責任。