

MACMILLAN CANCER SUPPORT

Lorlatinib: Chinese (Hong Kong)

勞拉替尼 (Lorlatinib)

勞拉替尼屬於一組稱為酪氨酸激酶抑制劑的標靶治療藥物。這種藥物用於治療非小細胞肺癌。

什麼是勞拉替尼 (Lorviqua[®]) ?

勞拉替尼屬於一組稱為酪氨酸激酶抑制劑的標靶治療藥物。這種藥物也被稱為癌細胞增長抑制劑。勞拉替尼用於治療以下類型的非小細胞肺癌：

- 含有名為 ALK 基因變異的癌症；
- 已擴散到身體的其他部位的癌症。

癌細胞將會接受基因變異的測試，以確定勞拉替尼是否適合您。

有時候也可用於治療其他癌症。最好將這些資訊與我們有關標靶治療藥物和您所患癌症類型的一般資訊一起閱讀。

在您同意（允許）接受治療之前，您的癌症醫生會向您介紹這種治療方法及其潛在副作用。

有關此療法的更多資訊

此資訊在發佈時正確無誤。但有時，這種治療所用於的癌症類型或治療副作用可能會在修訂日期之間發生變化。

如果您想了解有關這種治療的更多詳細資訊，可以與您的癌症治療團隊聯絡。

或者瀏覽電子藥品綱要 (eMC) 網站，該網站上有單個藥物的患者資料單張 (PIL)。

勞拉替尼的給藥方式

勞拉替尼有片劑形式，讓您可以帶回家服用。勞拉替尼為單獨給藥。在治療期間，您通常會見到：

- 癌症醫生
- 癌症護士或專科護士
- 專科藥劑師。

這些人就是我們在本資訊中所提到的醫生、護士和藥劑師。

在治療之前或治療期間，護士或接受過抽血培訓的人員會採集您的血液樣本。這用以檢查您是否可以安全接受治療。

在接受治療前，您將與醫生、護士或藥劑師交談。他們會問您最近身體感覺如何。

您的治療療程

您通常每天服用一次勞拉替尼藥片。護士或藥劑師會給您藥片帶回家。請堅持按照指引服用。這樣才能確保藥物發揮效用。您可能會獲得藥效強度不同的藥片。

只要勞拉替尼能對您發揮良好的療效，並且任何副作用皆可控制，您通常會繼續服用勞拉替尼。

請勿未經醫生的建議擅自停止服藥。

您的護士或藥劑師可能會給您抗噁心藥和其他藥物帶回家。請嚴格遵照指引服用這些藥物。

服用勞拉替尼藥片

每天在同一時間服用勞拉替尼藥片。可以在任何對您方便的時間服用，但應每天在相同的時間服用。

不一定要隨餐服用勞拉替尼藥片。用一整杯水將整片藥片吞下。請勿咀嚼或壓碎藥片。

服用勞拉替尼時，請勿飲用葡萄柚或飲用葡萄柚汁。因為這可能會增加副作用的風險。

若您忘記服用藥片，您應盡快服用漏服的劑量。如果距離下一次服藥的時間不足 4 小時，則請勿服用漏服的劑量。千萬不要為了彌補漏服的那一劑而服用雙倍劑量。

其他注意事項：

- 服用藥片後必須洗手。
- 其他人應避免直接接觸標靶治療藥物。
- 將藥物保存在原包裝內，常溫保存，避免濕氣、高溫和陽光直射。
- 將藥物放在安全而且兒童無法看到或觸及的地方。
- 如果您剛服用藥片後就感到不適，請聯絡醫院。請勿額外服用另一劑。
- 如果您已停止治療，將剩餘的藥片交回給藥劑師。

關於副作用

我們接下來會說明這種治療最常見的副作用。我們也將包括一些不太常見的副作用。

您可能會出現我們提及的某些副作用，但不太可能出現所有副作用。您可能會出現一些副作用，包括我們未在此列出的較罕見副作用。

其他癌症治療可能會引起不同的副作用。如果您也接受其他癌症治療，可能會出現其他副作用。

如果您出現任何副作用，請務必告知您的醫生、護士或藥劑師。他們可以給您：

- 幫助控制一些副作用的藥物
- 有關控制副作用的建議。

嚴格按照指示服用任何藥物都很重要。這樣藥物可能會對您更有成效。

嚴重和危及性命的副作用

一些癌症治療可能會引起嚴重的副作用。有時，這些副作用可能會危及生命。- 您的醫生、護士或藥劑師可以向您解釋這些副作用的風險。

聯絡醫院

您的醫生、護士或藥劑師將為您提供醫院的 24 小時聯絡電話。如果您感到不適或需要建議，不論是白天還是夜晚，您都可以隨時聯絡他們。請將這些電話號碼儲存在您的手機，或者保存在安全的地方。

常見副作用

貧血（紅血球數量減少）

此治療可能會導致您血液中的紅血球數量減少。紅血球為全身輸送氧氣。如果紅血球數量很少，這被稱為貧血。您可能會覺得：

- 沒有精力
- 呼吸困難
- 頭暈目眩

如果您出現這些症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院。您可能需要接受貧血治療。如果您是嚴重貧血，可能需要透過靜脈注射來輸注額外的紅血球。我們稱之為輸血。

膽固醇水平升高

這種治療方法會提高血液中膽固醇和其他脂肪的含量。您將需要定期驗血，檢查這些脂肪的水平。您的醫生可能會給您藥物來控制血液中的脂肪含量。

對神經系統的影響

勞拉替尼可能會影響神經系統。您可能會：

- 出現記憶問題
- 感到困惑
- 睡眠紊亂
- 說話困難，語速變慢或口齒不清
- 看見或相信不存在的事物（幻覺或妄想）——這種情況很罕見。

如果您有任何這些副作用，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

情緒變化

在治療期間，您可能會出現一些情緒變化。可能會讓您感到不安。您可能會感到焦慮、情緒低落或沮喪。您可能會出現情緒波動。如果您或親近的人發現您的情緒或行為有變化，請立即告知您的醫生或護士。

對肺部的影響

這種治療會影響您的肺部。若您出現以下症狀，請立即告知您的醫生：

- 咳嗽
- 胸痛
- 呼吸困難

如果之前的呼吸問題惡化，也應該告訴醫生。您可能需要接受測試，檢查您的肺部。您可能需要接受抗生素和類固醇治療。

水腫

您可能會體重增加，或者您的臉部、手臂、手部、腳部及身體其他部位出現腫脹。如果您有任何腫脹情況，請告知您的醫生。

手或腳麻木或刺痛（周邊神經病變）

這種治療可能會影響手指和腳趾的神經。這可能會導致您的手或腳麻木、刺痛或疼痛。

這稱為周邊神經病變。您可能會發現做一些需要細心操作的任務變得困難，比如扣鈕扣或綁鞋帶。如果您有這些症狀，請務必告訴您的醫生、護士或藥劑師。他們有時需要改變藥物或藥物劑量。治療結束後，症狀通常會緩慢地改善。但對於某些人來說，它們會持續存在，並且是治療的長期副作用。

腹瀉

該治療可能會導致腹瀉。腹瀉是指排便次數比正常情況多，或是水樣便或稀便。您還可能出現胃痙攣。如果您有造口，腹瀉可能會比平常更頻繁。

如果您每天排便 3 次或更多次，而這對您來說是不正常的，請盡快撥打 24 小時電話聯絡醫院。遵照他們的建議：

- 服用止瀉藥
- 飲用足夠的液體以保持水分並補充流失的鹽分和礦物質
- 任何可能有幫助的飲食改變。

他們還可能要求您提供糞便樣本，以便檢查您是否感染。

便秘

這種治療可能會導致便秘。便秘是指您不能像平時一樣通暢地排便。而是會變得困難或痛苦。以下是一些建議，可能對您有所幫助：

- 每天喝最少 2 公升 (3.5 品脫) 的水。
- 吃高纖維食物，例如水果、蔬菜和全麥麵包。
- 定期進行輕度運動，例如散步。

如果您有便秘，請撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院尋求建議。他們可以為您提供稱為瀉藥的藥物來幫助您。

如果您超過兩天無法排便並且出現噁心，請立即聯絡 24 小時電話號碼號碼。

視力變化

此治療可能會影響您的視力。如果您出現以下情況，請聯絡您的醫生：

- 單眼或雙眼看東西出現困難
- 重影
- 感覺看到閃光。

皮膚變化

這種治療可能會影響您的皮膚。可能會導致出現皮疹。您的醫生或護士會告知您可能出現的徵狀。若您感到皮膚乾燥，可每天嘗試使用不含香料的潤膚霜。

肌肉或關節疼痛

您可能會出現關節或肌肉疼痛。若您感到頭痛，請告訴您的醫生或護士。他們會給您建議和止痛藥或其他藥物來幫助您。積極參加體育鍛鍊並保持健康的體重可能有助於緩解疼痛。這可以保持關節靈活，減輕關節壓力。如果疼痛沒有好轉，請告訴醫生或護士。

感到疲倦（疲勞）

感到疲倦是這種治療的常見副作用。盡量根據自己的節奏計劃好每一天，以便您有足夠的時間休息。溫和的運動（例如短距離散步）可以幫助您減輕疲勞。若您感覺睏倦，切勿駕車或操作機械設備。

對心臟的影響

這種治療可能會影響心臟的運作方式。您的醫生可能會對您進行測試來檢查您的心臟功能。您可能在治療前、治療期間以及治療後進行這些測試。

若出現以下情況，請立即聯絡醫生：

- 感到頭暈、眩暈或昏厥
- 感到呼吸困難
- 感覺心跳太快或太慢。

其他疾病也可能導致這些症狀。最重要是讓醫生檢查。

對肝臟的影響

此治療可能會影響您肝臟的運作方式。您需要接受驗血以便確認您的肝臟功能。

頭痛

此治療可能會引起頭痛。如果您有頭痛，請告訴您的醫生、護士或藥劑師。他們可以為您提供可能有幫助的止痛藥建議。如果頭痛沒有好轉或加劇，請告訴他們。

體重增加

接受這種治療時，您可能會增加體重。護士或醫生可能會在您覆診時檢查您的體重。如有需要，他們可以給您建議並轉介給營養師。[健康飲食](#)和[積極鍛煉](#)有助於保持健康體重。

高血壓

勞拉替尼可能會導致某些患者出現高血壓。如果您在開始此治療前已有高血壓，請告知您的醫生、護士或藥劑師。

在您服用勞拉替尼期間，您將需要定期測量血壓。若您出現以下症狀，請告知您的醫生：

- 頭痛
- 眩暈
- 視力模糊

如果您出現高血壓，醫生將會為您提供處方藥物來幫助控制。

較少見的副作用

對胰臟的影響

此治療可能會影響您胰臟的運作方式。您需要定期接受驗血以便確認您的胰臟功能。

在極少情況下，胰臟會出現發炎。這稱為胰臟炎。若您出現以下症狀，請立即告知您的醫生：

- 腹痛或背痛
- 發癢
- 感到噁心
- 皮膚和眼睛發黃。

感覺噁心

您的醫生、護士或藥劑師可以處方一些抗噁心藥物來幫助您預防或控制噁心。即使您沒有噁心，也請嚴格遵守指示服藥。預防噁心比在出現噁心後再治療要更容易。

如果您感到噁心，可以經常以小口方式飲用飲料並少食多餐。飲用足夠的液體十分重要。如果您持續感到噁心，或 24 小時內噁心（嘔吐）1 至 2 次，請盡快撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院。他們會為您提供建議。他們可能會改變您的抗噁心治療藥物。如果您仍然感到噁心，請告知他們。

血糖升高

此治療可能會提高血糖水平。您將定期接受血液測試，檢查相關情況。

血糖升高的跡象包括：

- 感到口渴
- 尿頻
- 感覺比平常更疲倦。

如果您在治療期間或治療結束後出現這些症狀，請撥打 24 小時電話告知醫院。

如果您已患有糖尿病，您的血糖可能高於平常水平。您可能需要從家庭醫生或糖尿病團隊獲得建議和支援，以控制該疾病。

其他資訊

血栓風險

癌症和一些癌症治療可能會增加罹患血栓的風險。如果您在治療期間或治療後出現任何以下症狀，請立即撥打 24 小時電話號碼聯絡醫院：

- 腿部或手臂出現抽痛或腫脹
- 該區域的皮膚變紅 - 如果您的皮膚是黑色或啡色，這可能更難注意到，但皮膚可能會變黑
- 突然感覺呼吸困難或咳嗽。

如果您有以下情況，請務必撥打 999：

- 胸痛
- 呼吸困難。

血栓很嚴重，但可以用抗凝血劑藥物治療。這樣可以稀釋血液。您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供有關預防和治療血栓的更多資訊。

乳糖

該藥物含有乳糖。如果您是乳糖不耐症患者，治療前請告知醫生。

其他藥物

有些藥物可能會影響這種治療的效果，或在您接受治療時有害。請務必告知您的癌症醫師、護士或藥劑師您正在服用或計劃服用的任何藥物，例如：

- 您的處方藥物
- 您在商店、藥房或網上購買的藥物
- 維他命或保健品
- 草藥和輔助療法或順勢療法
- 娛樂性藥物 - 例如大麻。

接種疫苗

醫生通常建議癌症患者接種流感和新冠病毒（covid）疫苗。這些有助於降低因這些感染而患嚴重疾病的風險。大多數人都可以接種這些疫苗，包括免疫系統較弱的人。

如果您的免疫系統較弱，則不應接種減活疫苗。活性疫苗可能會讓您感到不適，因為它們含有非常弱的病原體。減活疫苗包括 Zostavax（一種帶狀皰疹疫苗）和黃熱病疫苗。

向您的醫生、護士或藥劑師詢問有關接種疫苗的建議非常重要。他們可以解釋哪些疫苗適合您以及何時最好接種疫苗。

避孕

您的醫生會建議您在接受治療期間，應避免讓自己或他人懷孕。藥物可能會損害胎兒的發育。治療期間，或治療結束之後至少 5 周內，採取高效避孕措施非常重要。例如，使用雙重避孕屏障法，例如避孕套和避孕隔膜。您應使用非激素類避孕方法，因為勞拉替尼可能會影響激素類避孕藥的效果。您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供更詳細的相關資訊。

生育能力

一些抗癌藥物可能會影響您是否可以懷孕或使他人懷孕。如果您擔心自己的生育能力受到影響，請務必在治療開始之前向您的醫生查詢。

哺乳

建議您在接受治療期間或治療結束後的一段時間內不要哺乳。這是因為嬰兒會藉由母乳攝取藥物。您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供更多資訊。

醫療和牙科治療

如果您因癌症以外的任何原因需要接受治療，請務必告訴專業醫護人員您正在接受癌症治療。向他們提供您的癌症醫生或癌症治療團隊的聯絡方式，以便他們尋求建議。

如果您預約牙醫，請務必告訴他們您正在接受癌症治療。在進行任何牙科治療之前，請先諮詢您的癌症治療團隊。

關於我們的資訊

本資訊由麥克米倫癌症援助機構（Macmillan Cancer Support）癌症資訊開發團隊編寫、修訂和編輯，內容已經過醫學專家和專業醫護人員和癌症患者的審查。

參考資料

瀏覽電子藥品綱要（eMC），下載患者資料單張（PIL），了解更多詳細資訊。該單張列出了所有已知的副作用。

癌症資訊開發團隊作者

審閱日期

審閱日期：2023 年 12 月 1 日 | 下次審閱日期：2025 年 12 月 1 日



我們的癌症資訊符合 PIF TICK 質素標準。

即是，這些資訊易於使用、及時更新並且基於最新證據。進一步了解我們如何製作我們的資訊。

我們使用的語言

我們希望每個受癌症影響的人都能感受到我們的資訊是為他們而寫的。我們希望能確保我們的資訊盡可能的清晰易明。為此，我們嘗試：

- 使用簡單的英語
- 對醫學詞彙加以解釋
- 使用簡短的句子
- 使用插圖解釋文字
- 清晰地編排資訊
- 確保清楚說明重點。

我們使用包容性別的語言，以「您」的口吻與讀者交談，讓每個人都感到自己被尊重。在臨床需要的情況下，我們使用「男士」和「女士」或「男性」和「女性」等用詞。例如，我們在談論身體部位或提及有關哪些人受影響的統計資料或研究時會這樣做。

您可以在[此處](#)進一步了解我們如何編製我們的資訊。

麥克米倫癌症援助機構 (Macmillan Cancer Support) 已付費請翻譯公司將上述資訊翻譯成您的語言。

獲得合適的護理和援助

如果您患有癌症並且不會說英語，您可能會擔心會影響您的癌症治療和護理。但是您的醫療團隊應該可以為您提供能滿足您需要的護理、援助和資訊。

我們知道，有時尋找合適的援助可能會面對額外的困難。例如，如果您有工作或家庭，可能很難抽出時間到醫院出席預約覆診。您可能還會擔心金錢和交通費。所有這些事情都會讓人感到壓力和難以應對。

但我們可以提供幫助。我們的支援熱線可以用您的語言就您的情況提供建議。您可以與護士、經濟援助顧問、福利權益顧問和工作援助顧問交談。我們還向癌症患者提供麥克米倫 (Macmillan) 資助金。這是一次性的款項，可用於支付醫院停車費、交通費、托兒或暖氣費等費用。

用您的語言詢問麥克米倫 (Macmillan)

您可致電麥克米倫 (Macmillan) 免費電話 0808 808 00 00 透過傳譯員用您的母語與我們交談。您可以同我們討論您的憂慮和醫療問題。致電時，只需需用英語告訴我們您想使用的語言。熱線服務時間為每週一到週日上午 8 時至晚上 8 時。

© Macmillan Cancer Support 2022 (麥克米倫癌症援助機構) 是於英格蘭和威爾斯 (261017)、蘇格蘭 (SC039907) 和馬恩島 (604) 註冊的慈善機構，同時也在北愛爾蘭經營。本機構是一間有限責任公司，於英格蘭和威爾斯註冊，公司編號 2400969。馬恩島公司編號 4694F。註冊辦事處：3rd Floor, Bronze Building, The Forge, 105 Sumner Street, London, SE1 9HZ。增值稅號：668265007

我們盡一切努力確保我們提供的資訊是準確和最新的，但請不要依賴這些資訊來替代針對您的情況的專業建議。在法律允許的範圍內，麥克米倫 (Macmillan) 不承擔與使用本出版物中的任何資訊或其中包含或提及的第三方資訊或網站相關的責任。